

CRITERI DI

SOSPENSIONE



FIDAS Donatori di Sangue



Fidas Donatori di Sangue –
Federata di Bergamo

Fidas Bergamo

**LINEE GUIDA AI CRITERI DI SOSPENSIONE DELLA DONAZIONE DEL SANGUE:
MOTIVI E TEMPISTICHE**

PERMANENTE

- Soggiorno in Gran Bretagna per un periodo complessivo superiore a 6 mesi dal 1980 al 1996
- Trasfusione con sangue prelevato in Gran Bretagna dal 1980
- Malattie infettive: epatite virale B, C, a eziologia ignota, sifilide, malaria, babesiosi, lebbra, leishmaniosi viscerale (Kala Azar), Tripanosoma Cruzi (M di Chagas)
- Positività per i test della sifilide (determinazione anti-Treponema P.), AIDS (determinazione HIV Ag/Ab), epatite B (HBsAg), epatite C (anti-HCV)
- Malattie cardiovascolari in atto o pregresse
- Malattie del sistema nervoso centrale
- Malattie con danno d'organo o malattie autoimmunitarie (a esclusione della malattia celiaca, purché il donatore segua una dieta priva di glutine)
- Gravi reazioni allergiche (shock anafilattico, edema della glottide)
- Diabete, a eccezione di coloro che sono ben controllati con il solo trattamento dietetico
- Assunzione abituale droghe leggere
- Trapianto d'organo
- Alcoolismo cronico

TEMPORANEA

Vaccinazioni

- anti: colera, difterite, epatite B e A, febbre delle montagne rocciose, influenza, pertosse, poliomielite (vaccino sottocute), tetano, tifo (vaccino sottocute), paratifo, rabbia (a scopo profilattico), papilloma virus, meningococco, pneumococco, vaccini desensibilizzanti (intramuscolo e per via orale) > [sospensione per 2 giorni](#)
- anti: febbre gialla, morbillo, parotite, poliomielite (vaccino orale), rosolia, tubercolosi, tifo (vaccino orale) > [sospensione per 1 mese](#)

Cure odontoiatriche

- applicazione di ponte dentario, corona, otturazioni, cure da parte di odontoiagienista > [sospensione per 2 giorni](#)
- estrazioni dentarie, devitalizzazioni, ablazione di tartaro, impianto con perno sintetico. > [sospensione per 15 giorni](#)

Infezioni

- febbre > 38°C (es. cistite, tonsillite, sindrome influenzale ecc.) > [sospensione per 15 giorni](#)
- mononucleosi, toxoplasmosi e malattia da Citomegalovirus, malattia di Lyme > [sospensione per 6 mesi](#)
- febbre Dengue > [sospensione per un anno](#)

Tumori

- Cancro in situ con guarigione completa > [sospensione per 5 anni](#)

Farmaci: per quanto riguarda la sospensione relativa all'assunzione di farmaci, il periodo di sospensione può variare (temporaneo e definitivo) a seconda del principio attivo del farmaco prescritto e della malattia oggetto di cura.

- somministrazione di antibiotici (assunti per via sistemica), antimicotici (assunti per via sistemica), antidiarroici, antivertiginosi, antinfiammatori, antistaminici > [sospensione per 15 giorni](#)

- reazioni allergiche a farmaci con particolare riguardo alla penicillina > [sospensione per un anno](#)

Viaggi all'estero

- soggiorno in zone endemiche per la malattia della Febbre del Nilo > [sospensione per 1 mese](#)
- soggiorno in zone endemiche per malattie tropicali (esclusa la malaria) > [sospensione per 3 mesi](#)
- soggiorno in zona malarica > [sospensione per 6 mesi](#)
- rientro da zona malarica dopo permanenza nei primi 5 anni di vita o per 5 anni consecutivi > [sospensione per 3 anni](#)

Interventi chirurgici o esami invasivi

- intervento chirurgico minore (cisti sebacee, lipomi, nevi benigni ecc.) > [sospensione per 1 mese](#)
- esame endoscopico con strumenti flessibili, interventi in endoscopia > [sospensione per 4 mesi](#)
- interventi chirurgici di media entità (appendicectomia, tonsillectomia, ecc.) e biopsia prostatica > [sospensione per 4 mesi](#)

Puntura da ago > [sospensione per 4 mesi](#)

- agopuntura (se non eseguita da professionisti qualificati con ago monouso)
- tatuaggio o piercing
- contatto delle mucose con sangue o lesioni da ago

Droghe

- assunzione occasionale di cannabis > [sospensione per 15 giorni](#)

Rapporti sessuali

- rapporti occasionali, anche protetti, con persone con cui non si abbia una relazione stabile > [sospensione per 4 mesi](#)
- rapporti sessuali con persone infette o a rischio di infezione da epatite B e C, HIV > [sospensione per 4 mesi](#)

Trapianti e trasfusioni > [sospensione per 4 mesi](#)

- trasfusione di sangue o di emocomponenti o somministrazione di emoderivati per esempio albumina, immunoglobuline, (la patologia che ha richiesto la trasfusione potrebbe controindicare la donazione permanentemente)
- trapianto di tessuti o cellule di origine umana (la patologia che ha richiesto il trapianto potrebbe controindicare la donazione permanentemente)

Gravidanza o aborto

- gravidanza o aborto dopo il terzo mese di gestazione > [sospensione per 12 mesi](#)
- aborto nei primi 3 mesi di gestazione > [sospensione per 6 mesi](#)

Insetti

- Puntura di zecca > [sospensione per 6 mesi](#)